

İnaktivləşdirilmiş poliomielit vaksini-nin (İPV) tətbiqi həyata keçirilə-cəkdir.



İPV uşaqları 1, 2 və 3-cü tip poliomielit viruslarından qoruyur.

Üçvalentli OPV-dən ikivalentli OPV-yə keçidlə bərabər İPV-nin tətbiqi uşaqları 2-ci tip poliomielit virusunun törətdiyi paralitik poliomielitdən, həmçinin virusun 1 və 3-cü tiplərindən qoruyacaqdır.

Uşaqlara OPV və İPV peyvəndləri mütləq aparılmalıdır ki, virusun gətirilməsi baş verərsə, peyvəndlər bir-birini gücləndirərək, uşağı poliomielitdən tam qorusun.



ORAL POLİOMIELİT VAKSİNİ (OPV)	İNAKTİVLƏŞ-DİRİLMİŞ POLİOMIELİT VAKSİNİ (İPV)
Uşaq doğulduqdan sonra 4-7-ci gün, sonra 2,3,4,18 aylığında damcı şəklində verilir.	Uşağın 6 aylığında inyeksiya ilə yeridilir.
Zəiflədilmiş virus tərkibli vaksindir.	Cansız virus tərkibli vaksindir.
Bağırsağ immuniteti yaradır.	Qan vasitəsilə immunitet yaradır.
Üç valentli OPV (tOPV) 1,2,3-cü tip poliomielit viruslarından qoruyur.	İPV 1,2,3-cü tip poliomielit viruslarından qoruyur.
İkivalentli OPV (bOPV) 1, 3-cü tip poliomielit viruslarından qoruyur.	



POLİOMIELİT XƏSTƏLİYİNƏ QARŞI İMMUNLAŞDIRMA TƏDBİRLƏRİ

